



D. IO. HIERON. KNIPHOFII

PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARII,





BOTANICA IN ORIGINALI

SEV

HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR

OPERA ET STVDIO

IOANNIS GODOFREDI TRAMPE

TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. VIII.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLXI.







Verzeichnis

derer in der VIIIten Centurie befindlichen Pflanzen.

NB. Die angeführten Benennungen aus Ihro Magnificenz des Herrn D. und Prof. Ludwigs Defin. gen. Plant. ſind nach der neueſten Edition von 1760.

A.

Acalypha virginica.
Achyranthes lappacea.
Adoxa Moſchatellina.
Allium ſeneſcens.
5 - - - Schoenopraſum. *Schnittlauch.*
Alyſſum Alyſſoides.
- - - - incanum.
Ammi maius.
Aſphodelus luteus. *gelber Aſphodel.*
10 Aſter Amellus.
Aſtragalus Cicer.
- - - - contortuplicatus.

B.

Bidens bipinnata.
Boerhavia diandra.
15 Briza maxima.
- - - minor.
Browallia demiſſa.
Bunias Cakile.

C.

Cactus Opuntia. *Indianiſche Feige.*
20 Calendula pluuialis.
Campanula perfoliata.
- - - - Speculum Veneris.
Centaurea ſolſtitialis.
Ceraſtium aruenſe.
25 Chaerophyllum bulboſum. *Peperle. Pimperlimpimp.*
Chelidonium maius.
- - - - - offic. *Schellkraut.*
Cleome gynandra.
Clinopodium perenne.
30 Commelina africana.
- - - - tuberoſa.
Coriſpermum hyſſopifolium.
Crithmum maritimum.
Crucianella anguſtifolia.
35 Cynanchum monſpeliacum.
Cynogloſſum linifolium.
Cynoſurus aureus.

D.

Dracocephalum peltatum.

E.

Euphorbia maculata.
40 Euphraſia officinalis. *Augentroſt.*

F.

Fagonia cretica.
Fragaria veſca ſylueſtris. *Felderdber.*

G. Gal-

G.

Galeopſis Tetrahit.
Gentiana Centaurium. *Tauſendgülden-kraut.*
45 - - - Pneumonanthe. *Lungenblume.*
Geranium gibboſum.
Goſſypium herbaceum, *Baumwolle.*

H.

Hedyſarum Onobrychis. *Esparcette.*
- - - - violaceum.
50 Hibiſcus Sabdariffa.
Hypericum hircinum. *ſtinkend Iohannis-kraut.*
- - - - hirſutum. *rauh Iohannis-kraut.*

I.

Ipomoea Quamoclit.
Iris biflora.
55 - - pumila.

L.

Lauatera trimeſtris.
Leonurus Marrubiaſtrum.
Linum catharticum.
- - Radiola.
60 Lobelia ſiphylitica.
Lonicera Periclymenum.
Lotus hirſuta.
- - recta.
Lyſimachia Nummularia. *Pfennigkraut.*

M.

65 Marrubium Pſeudo-dictamnus.
Martynia annua.
Medicago ſatiua. *Lucerne.*
Melianthus minor.
Meſembryanthemum tortuoſum.
70 - - - - - - Tripolium.
Mollugo verticillata.
Momordica Elaterium. *Eſelsgurke.*

N.

Napaea hermaphrodita.

O.

Oenanthe pimpinelloides.
75 Ononis alopecuroides.
Othonna Cineraria.

P.

Potentilla alba.
- - - verna.

R.

Rumex ſcutatus. *Spaniſcher Sauerampfer.*

S.

80 Saluia viridis.
Sambucus nigra laciniata.
Scorpiurus muricata.
Scutellaria galericulata.
Selago corymboſa.
85 Sida rhombifolia.
Sideritis perfoliata.
Silene anglica.
- - Armeria
Siſymbrium arenoſum.
90 Spartium monoſpermum.
Statice monopetala.

T.

Teucrium Chamaepitys. *Feldcypreſs.*
Thymus Acinos.
- - - Zygis.
95 Tordylium ſyriacum.
Tulipa ſylueſtris. *wilde Tulpe.*

V.

Vaccinium Myrtillus *Heidelber.*
Valeriana Locuſta veſicaria.
Vinca roſea.

Z.

100 Ziziphora capitata.



8/1. ACALYPHA inuolucris femineis cordatis inciſis, foliis
ouato-lanceolatis petiolo longioribus.
Linn. S. P. 1003. *Ludw.* D. G. P. 1129.
. . . . . virginica.





8.
2.


ACHYRANTHES caule erecto, ſpica interrupta, floſculis ternis: lateralibus vtrinque faſciculo ſetarum vncinato. *Linn.* Syſt. X. 254. n. 2. *Ludw.* D. G. P. 677.

- - - lappacea.




8/3. ADOXA. *Linn.* S. P. 367.

Moſchatellina. *Ludw.* D. G. P. 192.



8. ALLIVM ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus ſubtus con-
4. vexis laeuibus, vmbella ſubrotunda, ſtaminibus
ſubulatis. *Linn.* S. P. 299. *Ludw.* D. G. P. 912.
. . . . ſeneſcens.





8./5 ALLIVM ſcapo nudo adaequante folia teretia ſubulato-filiformia. *Linn.* S. P. 301. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 912. Schoenopraſum.



8.
6.

ALYSSVM ſtaminibus quatuor dentatis; duobus ſquama longitudinali, calycibus perſiſtentibus.
Linn. Syſt. X. 1130. S. P. 652. Clypeola Alyſſoides.
Ludw. D. G. P. 554.

Alyſſoides.





8/7 ALYSSVM caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerri-
mis, floribus corymboſis. *Linn.* S. P. 650.
Ludw. D. G. P. 554.
- - - - - incanum.



8/8.

AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ſerratis: ſuperioribus multifidis linearibus. *Linn.* S. P. 243. *Ludw.* D. G. P. 880.
\- - - maius.



8.
9. ASPHODELVS caule folioſo, foliis triquetris ſtriatis.
Linn. Syſt. X. 982. S. P. 309. *Ludw.* D. G. P. 169.
• • • luteus.



8/10 ASTER foliis lanceolatis obtuſis ſcabris trineruiis integris, pedunculis nudiuſculis corymboſis, ſquamis calycinis obtuſis. *Linn.* S. P. 873. *Ludw.* D. G. P. 457.

Amellus.





8.
11. ASTRAGALVS cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubgloboſis inflatis mucronatis piloſis. *Linn.* S. P. 757. *Ludw.* D. G. P. 653.

Cicer.

Cicer ſylueſtre minus. Thal. hercyn. 34.



8/12. ASTRAGALVS cauleſcens procumbens, leguminibus contortuplicatis canaliculatis villoſis. *Linn.* S. P. 758. *Ludw.* D. G. P. 653.

- - - - - - contortuplicatus.



8/13, BIDENS foliis bipinnatis inciſis, calycibus inuolucratis,
corollis ſemiradiatis, ſeminibus diuergentibus.
Linn. S. P. 832. *Ludw.* D. G. P. 472.
- - - bipinnata.





8./14. BOERHAVIA glabra, floribus diandris. *Linn.* S. P. 1194.
Ludw. D. G. P. 8.

- - - - - diandra.



8.
15.

BRIZA ſpiculis cordatis, floſculis ſeptem-decim. *Linn.* S. P. 70. *Ludw.* D. G. P. 1054.

- - - maxima.

III . 2



8.
16.
BRIZA ſpiculis triangulis, calyce floſculis longiore. *Linn.* S. P. 70. *Ludw.* D. G. P. 1054.
- - - minor.

III. 2



8.
VI.

BROWALLIA peduncolis vnifloris. *Linn.* Syſt. X. 691.
Ludw. D. G. P. 319.
- - - - - demiſſa.



8.
18. BVNIAS ſiliculis ouatis laeuibus ancipitibus.
Linn. S. P. 670.
Cakile. *Ludw.* D. G. P. 529.



8./19. CACTVS articulato-prolifer laxus, articulis ouatis, ſpinis ſetaceis. *Linn.* S. P. 468.

Opuntia. *Ludw.* D. G. P. 229.



8/20. CALENDVLA foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis filiformibus. *Linn.* S. P. 921. *Ludw.* D. G. P. 448.

- - - - - pluuialis.





8./21. CAMPANVLA caule ſimplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus floribus ſeſſilibus adgregatis. *Linn.* S. P. 169. *Ludw.* D. G. P. 100.

. . . . . perfoliata.




8/22. CAMPANVLA caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis oblongis ſubcrenatis, calycibus ſolitariis corolla longioribus, capſulis prismaticis. *Linn.* S. P. 168. *Ludw.* D. G. P. 63.
Speculum Veneris.



8./23. CENTAVREA calycibus duplicato-ſpinoſis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis; caulinis lyrato-pinnatifidis. *Linn.* S. P. 917. *Ludw.* D. G. P. 479.

. . . ſolſtitialis.



8/24. CERASTIVM foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce maioribus. *Linn.* S. P. 438. *Ludw.* D. G. P. 754.

\- - - - aruenſe.



8/25. CHAEROPHYLLVM caule laeui: geniculis tumidis.
Linn. S. P. 258. *Ludw.* D. G. P. 858.
. . . . . bulboſum.





8/26 CHELIDONIVM pedunculis vmbellatis.
Linn. S. P. 505. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 585.
- - - - - maius.



8/27. CHELIDONIVM pedunculis vmbellatis.
Linn. S. P. 505. variet. α.
Ludw. D. G. P. 585.
- - - - - - - maius. officin.





8/28. CLEOME floribus gynandris, foliis digitatis. *Linn.* S. P. 671.
Ludw. D. G. P. 608.
\- - - - gynandra.



8/29 CLINOPODIVM foliis ſubrotundo-acuminatis neruoſis ſubſerratis, caule procumbente, floribus verticillatis. Zinn. H. Goetting. 312. *Ludw.* D. G. P. 298.

- - - perenne, (pulegii odore, maioranae folio.)





8./30. COMMELINA corollis inaequalibus, foliis lanceolatis glabris obtuſis, caule repente. *Linn.* S. P. 41. *Ludw.* D. G. P. 489.

- - - - - - africana.

III. 1



8/81 COMMELINA corollis aequalibus, foliis ouato-lanceolatis ſubciliatis. *Linn.* S. P. 41.
Ludw. D. G. P. 489.
. . . . . . tuberoſa.

III






8/32 CORISPERMVM floribus lateralibus. *Linn.* S. P. 4.
Ludw. D. G. P. 480.
- - - - - - - - hyſſopifolium.

I. 2





8/33. CRITHMVM foliolis lanceolatis carnoſis. *Linn.* S. P. 246.
Ludw. D. G. P. 849.
\- - - - - - maritimum.





8./34. CRVCIANELLA erecta, foliis ſenis linearibus.
Linn. S. P. 108.
Rubeola. *Ludw.* D. G. P. 14.
- - - - - - - anguſtifolia.

IV. 1



8/35.

CYNANCHVM caule volubili herbaceo, foliis reni-
formi-cordatis acutis. *Linn.* S. P. 212.
Ludw. D. G. P. 150.
- - - - - - monſpeliacum.



8/36 CYNOGLOSSVM foliis lineari-lanceolatis.
Linn. S. P. 134. variet. α.
Omphalodes. *Ludw.* D. G. P. 65.
- - - - - - linifolium.




8/37. CYNOSVRVS paniculae ſpiculis ſterilibus pendulis ternatis,
floribus ariſtatis. *Linn.* S. P. 73.
Hohyrodes. *Ludw.* D. G. P. 1051.
. . . . aureus.

III 2




8./38. DRACOCEPHALVM floribus verticillatis, bracteis orbi-
culatis ſerrato-ciliatis. *Linn.* S. P. 596.
Moldauica. *Ludw.* D. G. P. 280.
- - - - - - - - peltatum.



8./39. EVPHORBIA dichotoma, foliis ſerratis oblongis piloſis, floribus axillaribus ſolitariis, ramis patulis. *Linn.* S. P. 455. *Ludw.* D. G. P. 232.

. . . . . maculata.





8/10. EVPHRASIA foliis ouatis argute dentatis. *Linn.* S. P. 604.
Ludw. D. G. P. 248.
. . . . . . officinalis.



8. FAGONIA ſpinoſa, foliolis lanceolatis planis laeuibus.
41. *Linn.* S. P. 386. *Ludw.* D. G. P. 739.
- - - - cretica.



8. FRAGARIA flagellis reptans. *Linn.* S. P. 494. variet. α.
412. *Ludw.* D. G. P. 808.
\- - - - veſca ſylueſtris.
\- - - - officin.



8/43. GALEOPSIS internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis. *Linn.* S. P. 579. variet. *α.* *Ludw.* D. G. P. 272.

Tetrahit.



8. / 11. **GENTIANA** corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo. *Linn*: S: P. 229: variet. α.
Centaurium. *Ludw*. D. G. P. 147:
- - - - minus. officin.



8. / 15. GENTIANA corollis quinquefidis, campanulatis oppoſitis pedunculatis, foliis linearibus. *Linn.* S. P. 228. *Ludw.* D. G. P. 146.

Pneumonanthe.



8/46

GERANIVM calycibus monophyllis, caule carnoſo gibboſo, foliis ſubpinnatis. *Linn.* S. P. 677. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - gibboſum.



8. / 17. GOSSYPIUM foliis quinquelobis, caule herbaceo.
Linn. S. P. 693. *Ludw.* D. G. P. 215.
- - - - - herbaceum.



8./48. HEDYSARVM foliis pinnatis, leguminibus monoſpermis aculeatis, corollarum alis breuiſſimis, caule elongato. *Linn.* S. P. 751.

Onobrychis. *Ludw.* D. G. P. 610.





8/49 HEDYSARVM foliis ternatis ouatis, floribus geminatis, leguminibus nudis venoſis monoſpermis. *Linn.* S. P. 749. *Ludw.* D. G. P. 649.

. . . . . . violaceum.





8. / 50. HIBISCVS foliis ſerratis: inferioribus ouatis indiuiſis, ſuperioribus tripartitis, caule aculeato. *Linn.* S. P. 695. var. γ.
Ketmia. *Ludw.* D. G. P. 216.

Sabdariſſa.





8./81. HYPERICVM floribus trigynis, ſtaminibus corolla longioribus, caule fruticoſo ancipiti. *Linn.* S. P. 784. *Ludw.* D. G. P. 795.

\- - - - - hircinum.



8./52. HYPERICVM floribus trigynis: calycibus ſerrato-glandu-loſis, caule tereti erecto, foliis ouatis ſubpubeſcentibus. *Linn.* Syſt. X. 1184. *Ludw.* D. G. P. 795.

. . . . hirſutum.



8. IPOMOEA foliis pinnatifidis linearibus, floribus ſolitariis.
53. *Linn.* S. P. 159.
Conuoluulus. *Ludw.* D. G. P. 105.
Quamoclit.



8.
54.

IRIS corollis barbatis, caule foliis breuiore, multifloro. *Linn.* S. P. 38. *Ludw.* D. G. P. 262.
- - - biflora.

III. s



8. / 55. IRIS corollis barbatis, caule foliis breuiore vnifloro.
Linn. S. P. 38. *Ludw.* D. G. P. 262.
- - - pumila.

III. 5



8./56. LAVATERA foliis glabris, caule ſcabro herbaceo, pedunculis vnifloris, fructibus orbiculo tectis.
Linn. S. P. 692. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 210.
\- - - - trimeſtris.





8. / 57. LEONVRVS foliis ouatis lanceolatisque ſerratis, calycibus ſeſſilibus ſpinoſis. *Linn.* S. P. 584.
Cunila. *Ludw.* D. G. P. 286.

Marrubiaſtrum.





8./58. LINVM foliis oppoſitis ouato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Linn.* S. P. 281. *Ludw.* D. G. P. 719.

- - - catharticum. officin.



8./59 LINVM foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Linn.* S. P. 281. *Ludw.* D. G. P. 719.

Radiola.



8/60 **LOBELIA** caule erecto, foliis ouato-lanceolatis crenatis, calycum ſinubus reflexis. *Linn.* S. P. 931. *Ludw.* D. G. P. 362.

- - - - ſiphilitica.



8. / 61. LONICERA capitulis ouatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. *Linn.* S. P. 173. variet. β.
Caprifolium. *Ludw.* D. G. P. 368.

Periclymenum.





8. / 62. **LOTVS** capitulis hirſutis, caule erecto hirto, leguminibus ouatis. *Linn.* S. P. 775. *Ludw.* D. G. P. 633.

. . . hirſuta.





8.
63.

LOTVS capitulis ſubglobofis, caule erecto, leguminibus rectis glabris. *Linn.* S. P. 775. *Ludw.* D. G. P. 633.

- - - recta.





8/61. LYSIMACHIA foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Linn.* S. P. 148. *Ludw.* D. G. P. 70.
Nummularia. officin.



8. MARRVBIVM calycum limbis planis villoſis, foliis cordatis,
65. caule fruticoſo. *Linn.* S. P. 583.
Pſeudo-dictamnus. *Ludw.* D. G. P. 295.



8.
66. MARTYNIA caule ramoſo, foliis integerrimis, calycibus cordato-lobatis: exterioribus diphyllis.
Linn. Syſt. 10. p. 1113. S. P. 618. *Ludw.* D. G. P. 345.
- - - - annua.



8./67. MEDICAGO pedunculis racemoſis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn.* S. P. 778. *Ludw.* D. G. P. 650.

\- - - - - ſatiua.

Lucerne vulgo.



8/68 MELIANTHVS ſtipulis geminis diſtinctis. *Linn.* S. P. 639.
Ludw. D. G. P. 605.
- - - - minor.



8./69. MESEMBRYANTHEMVM foliis planis oppoſitis ouatis acuminatis connatis integerrimis. *Linn.* S. P. 487. var. α.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - - tortuoſum.



8/70. MESEMBRYANTHEMUM foliis lanceolatis planis crenulatis. *Linn.* S. P. 481.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.

Tripolium.



8./71. MOLLVGO foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule
ſubdiuiſo decumbente, pedunculis vnifloris.
Linn. S. P. 89. *Ludw.* D. G. P. 956.
- - - - - verticillata.

III 3



8./72. MOMORDICA pomis hiſpidis, cirrhis nullis. *Linn.* S. P. 1010.
Elaterium. *Ludw.* D. G. P. 1074.
Elaterium ſ. Cucumis aſininus. officin.



8.
73.
NAPAEA pedunculis nudis laeuibus, foliis glabris, floribus hermaphroditis. *Linn.* S. P. 686. *Ludw.* D. G. P. 214.
. . . hermaphrodita.





8/74. OENANTHE foliolis radicalibus ouatis inciſis, caulinis integris linearibus longiſſimis ſimplicioribus. *Linn.* S. P. 255. *Ludw.* D. G. P. 861.

- - - - - pimpinelloides.





8.
75. ONONIS ſpicis folioſis, foliis ſimplicibus obtuſis.
Linn. S. P. 717.
Anonis. *Ludw.* D. G. P. 627.
- - - alopecuroides.



8.
76.

OTHONNA foliis pinnatifidis ſubuilloſis: laciniis ſinuatis, caule herbaceo. *Linn.* S. P. 925.
Senecio. *Ludw.* D. G. P. 462.

Cineraria.



8/77 POTENTILLA foliis quinatis apice conniuenti-ſerratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirſutis. *Linn.* S. P. 498. *Ludw.* D. G. P. 807.

- - - alba.



8.
78. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis; caulinis ternatis, caule declinato.
Linn. Syſt. X. 1064. S. P. 498. *Ludw.* D. G. P. 807.
- - - - verna.



8. / 79. RVMEX *floribus hermaphroditis, foliis cordato haſtatis.*
Linn. S. P. 337. *Ludw.* D. G. P. 985.
- - - ſcutatus.





8.
80.

SALVIA foliis oblongis crenatis, corollarum galea ſemi-orbiculata, calycibus fructiferis reflexis.
Linn. S.P. 24. *Ludw.* D.G.P. 242.
- - - viridis.

II.5





8.
81. SAMBVCVS cymis quinquepartitis, caule arboreo.
Linn. S. P. 269. variet. γ. *Ludw.* D. G. P. 159.
- - - - nigra laciniata.





8/82. SCORPIVRVS pedunculis bifloris, leguminibus extrorſum obtuſe aculeatis. *Linn.* S. P. 745.
Ludw. D. G. P. 646.

. . . . . . muricata.



8. SCVTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Linn.* S. P. 599.
83. Caſſida. *Ludw.* D. G. P. 282.
. . . . galericulata.





8. / 84. SELAGO corymbo multiplici. *Linn.* S. P. 629.
Manettia. *Ludw.* D. G. P. 267.
- - - - - corymboſa.




8./85. SIDA foliis lanceolato-rhomboidibus ſerratis. *Linn.* S.P. 684.
Maluinda. *Ludw.* D. G. P. 212.
- - - rhombifolia.





8.
86. SIDERITIS herbacea hiſpido-piloſa, foliis ſuperioribus amplexicaulibus. *Linn.* S. P. 575.
Betonica. *Ludw.* D. G. P. 283.
- - - - - perfoliata.





8./87. SILENE hirſuta, petalis emarginatis, floribus erectis, fructibus reflexis hirſutis alternis. *Linn.* S. P. 416.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 757.
. . . anglica.



8/88. SILENE floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis glabris. *Linn.* S.P. 420.
Lychnis. *Ludw.* D.G.P. 757.
Armeria.



8./89. SISYMBRIVM foliis haſtato-dentatis ſcabris, caule ſubnudo ramoſo. *Linn.* Syſt. X. 1132. S. P. 658. *Ludw.* D. G. P. 535.

- - - - arenoſum.



8./90. SPARTIVM ramis angulatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis. *Linn.* S. P. 708. *Ludw.* D. G. P. 657.

- - - - monoſpermum.



8./91. STATICE caule fruticoſo folioſo ramoſo, foliis ſubulatis.
Linn. S. P. 276.
Limonium. *Ludw.* D. G. P. 713.
- - - - monopetala.




8/92. TEVCRIVM foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, caule diffuſo.
Linn. Syſt. 1094. S. P. 562.
Bugula. *Ludw.* D. G. P. 270.
Chamaepitys. officin.





8.
93. THYMVS floribus verticillatis, pedunculis vnifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Linn.* S. P. 591. *Ludw.* D. G. P. 291.

Acinos.



8./94. THYMVS floribus verticillato-ſpicatis, caule ſuffruticoſo, foliis linearibus baſi cileatis. *Linn.* S. P. 591. *Ludw.* D. G. P. 291.

Zygis.



8. TORDYLIVM inuolucris vmbella longioribus.
95. *Linn.* S. P. 239. *Ludw.* D. G. P. 845.
. . . . ſyriacum.



8.
96. TVLIPA flore ſubnutante, foliis lanceolatis.
Linn. S. P. 305. *Ludw.* D. G. P. 903.
- - - - ſylueſtris.



8. / 97. VACCINIVM pedunculis vnifloris, foliis ouatis ſerratis deciduis, caule angulato. *Linn.* S. P. 349. *Ludw.* D. G. P. 189.

Myrtillus. officin.





8. / 98. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Linn.* S. P. 33. variet. β. calycibus inflatis.
Valerianella. *Ludw.* D. G. P. 258.
- - - - veſicaria.

III J



8. / 99. VINCA caule fruteſcente erecto rigido foliis ouatis. *Linn.* Syſt. X. 944.
Peruinca. *Ludw.* D. G. P. 87.
. . . roſea.



8.
100.
ZIZIPHORA capitulis terminalibus, foliis ouatis.
Linn. S. P. 21. *Ludw.* D. G. P. 247.
- - - - capitata.

II. 3